

Malaria

NOTFALLTHERAPIE 2010/2011

Blau www.osir.ch/PDF/merkblnotfall6.pdf

Prinzip:

Sie **verzichten** auf eine **vorbeugende Einnahme** von Malariatabletten, schützen sich optimal vor Mückenstichen und führen ein Malari**notfall**medikament mit sich!

Sie nehmen die Tabl. ein:



bei Auftreten von **Fieber** axillär (grösser 37.5 Grad C) während eines Aufenthaltes von mindestens **6 Tagen** in Gebiet mit Malariavorkommen falls innert **24 Stunden** keine ärztliche Hilfe möglich ist vor Einnahme der Tabletten **Fieber senken** Malaria Tabletten mit genügend **Flüssigkeit** einnehmen noch im Aufenthaltsland Arzt aufsuchen



Mückenschutz

durch langärmelige Hosen/geschlossene Schuhe/Auftragen von mückenabstossenden Mitteln im Schlafzimmer ohne Klimaanlage -> (imprägniertes) Moskitonetz

Was muss der Hausarzt vor der Verschreibung der Tabletten wissen?

Einnahme von Medikamenten (Betablocker), Antiepileptika -->Arzt fragen



Antidepressiva

Schwangerschaft, Stillen; Medikamentenunverträglichkeit, Herzrhythmusstörungen, verlängerte QT Zeit

Fieber

nach Tropenaufenthalt – **Alarmsymptom!** gleichentags Arzt aufsuchen für Blutuntersuch

<p>Malarone® (AP) ATOVAQUONE +PROGUANIL</p> <p>für welche Reiseziele: Thailand, Vietnam, Laos, Kambodscha, Philippinen, Malaysia, Indonesien inclus. Bali, Iran, Pakistan, Afghanistan, Indien, Sri Lanka, Jemen, Südamerika</p> <p>für Reisende mit Mefloquinunverträglichkeit</p> <p>Dosierung: An 3 Tagen</p> <p>je: >40kg: 1 x 4 Tbl tägl. 31-40kg: 1 x 3 Tbl.tägl. 21-30kg: 1 x 2 Tbl tägl. 11-20kg: 1 x 1 Tbl tägl.</p>	<p>Riamet® (AL) ARTEMETER +LUMEFANTRIN</p> <p>für welche Reiseziele: Thailand, Vietnam, Laos, Kambodscha, Philippinen, Malaysia, Indonesien, Iran, Pakistan, Afghanistan, Indien, Sri Lanka, Jemen, Südamerika mit Lariam/Mephaquinunverträglichkeit</p> <p>für Reisende</p> <p>Dosierung:</p> <p>Erwachsene und Kindern ≥35 kg Körpergewicht oder ab 12 Jahren 2x 4Tbl pro Tag x 3Tage (0,8,24,36,48,60h)</p> <p>Kinder: 5-15kg: 2x1 Tbl pro Tag x 3 Tage Kinder: 15-25kg: 2x2 Tbl pro Tag x 3 Tage Kinder: 25-35kg: 2x3 Tbl pro Tag x 3 Tage</p>																								
<p>Lariam® / Mephaquin® MEFLOQUIN</p> <p>für welche Reiseziele: gewisse südamerikan. Länder, Philippinen, Malaysia, Indonesien inclus. Bali, Iran, Pakistan, Afghanistan, Indien, Sri Lanka, Jemen</p> <p>Dosierung:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Körpergewicht</th> <th>Gesamtdosis</th> <th>Aufteilung der Dosis (*)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>5-10 kg</td> <td>1/2-1 Tablette</td> <td></td> </tr> <tr> <td>10-20 kg</td> <td>1-2 Tabletten</td> <td></td> </tr> <tr> <td>20-30 kg</td> <td>2-3 Tabletten</td> <td>2 oder 2+1</td> </tr> <tr> <td>30-45 kg</td> <td>3-4 Tabletten</td> <td>2+1 oder 2+2</td> </tr> <tr> <td>45-60 kg</td> <td>5 Tabletten</td> <td>3+2</td> </tr> <tr> <td>>60 kg</td> <td>6 Tabletten</td> <td>3+2+1</td> </tr> </tbody> </table> <p>bei Unverträglichkeit oder Abneigung gegenüber Mefloquin: → Malarone oder Riamet</p>		Körpergewicht	Gesamtdosis	Aufteilung der Dosis (*)	5-10 kg	1/2-1 Tablette		10-20 kg	1-2 Tabletten		20-30 kg	2-3 Tabletten	2 oder 2+1	30-45 kg	3-4 Tabletten	2+1 oder 2+2	45-60 kg	5 Tabletten	3+2	>60 kg	6 Tabletten	3+2+1			
Körpergewicht	Gesamtdosis	Aufteilung der Dosis (*)																							
5-10 kg	1/2-1 Tablette																								
10-20 kg	1-2 Tabletten																								
20-30 kg	2-3 Tabletten	2 oder 2+1																							
30-45 kg	3-4 Tabletten	2+1 oder 2+2																							
45-60 kg	5 Tabletten	3+2																							
>60 kg	6 Tabletten	3+2+1																							
<p>WEITERE INFORMATIONEN</p> <p>web www.osir.ch</p> <p>Telefoninfos 0900 288 255 / 071 288 50 66</p> <p>Hausarzt http://www.osir.ch/m_inforeis_ende/hausarzt.php</p> <p>OSIR Arzt http://www.osir.ch/m_osiraerzte/aerzte.php</p> <p>Auslandreisen www.osir.ch/PDF/auslandreisen.pdf</p>	<p>Chlorochin® CHLOROQUIN (155mg Chloroquin)</p> <p>für welche Reiseziele: Dominikanische Republik, mittelamerikanische Länder (ausser Mexiko)</p> <p>Dosierung:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Körpergewicht</th> <th>1. Tag</th> <th>1. Tag</th> <th>Tagesdosis für weitere</th> </tr> <tr> <th></th> <th>1. Dosis</th> <th>2. Dosis</th> <th>2-3 Tage</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td>(6 h später)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Ab 30 kg</td> <td>2 Tabl.</td> <td>1 Tabl.</td> <td>1 Tabl.</td> </tr> <tr> <td>Ab 63 kg</td> <td>4 Tabl.</td> <td>2 Tabl.</td> <td>2 Tabl.</td> </tr> <tr> <td>Ab 94 kg</td> <td>6 Tabl.</td> <td>3 Tabl.</td> <td>3 Tabl.</td> </tr> </tbody> </table>	Körpergewicht	1. Tag	1. Tag	Tagesdosis für weitere		1. Dosis	2. Dosis	2-3 Tage			(6 h später)		Ab 30 kg	2 Tabl.	1 Tabl.	1 Tabl.	Ab 63 kg	4 Tabl.	2 Tabl.	2 Tabl.	Ab 94 kg	6 Tabl.	3 Tabl.	3 Tabl.
Körpergewicht	1. Tag	1. Tag	Tagesdosis für weitere																						
	1. Dosis	2. Dosis	2-3 Tage																						
		(6 h später)																							
Ab 30 kg	2 Tabl.	1 Tabl.	1 Tabl.																						
Ab 63 kg	4 Tabl.	2 Tabl.	2 Tabl.																						
Ab 94 kg	6 Tabl.	3 Tabl.	3 Tabl.																						

mögliche Medikamentennebenwirkungen

Lariam/Mephaquin:
Malarone:
Artemether

Schwindel, Uebelkeit, **aussergewöhnliche psychische Reaktionen**, Kopfweh, Hautreaktionen
Bauchweh, Kopfweh, Uebelkeit, Erbrechen, Durchfall, Husten
Schwindel, Kopfweh, Uebelkeit, Durchfall, Müdigkeit



OSIR
9016 St. Gallen Rorschacherstr.238
Tel 0900 288 255 Fax 071 288 18 48