

# Malaria

## Notfallbehandlung

2012 / 2013

[www.osir.ch/PDF/merkblNotfall6.pdf](http://www.osir.ch/PDF/merkblNotfall6.pdf)

### Prinzip

Sie nehmen die Tabletten ein:

Sie verzichten auf eine vorbeugende Einnahme von Malariatabletten, schützen sich optimal vor Mückenstichen und führen ein Malarianotfallmedikament mit sich!

- bei Auftreten von Fieber axillär (grösser 37.5 Grad C)
- während eines Aufenthaltes von mindestens 6 Tagen in Gebiet mit Malariavorkommen
- falls innert 24 Stunden keine ärztliche Hilfe möglich ist
- vor Einnahme der Tabletten Fieber senken,
- Malaria Tabletten mit genügend Flüssigkeit einnehmen
- noch im Aufenthaltsland Arzt aufsuchen

### Mückenschutz

durch langärmelige Hosen/geschlossene Schuhe/Auftragen von mückenabstossenden Mitteln im Schlafzimmer ohne Klimaanlage -> (imprägniertes) Moskitonetz

### Was muss der HausArzt vor der Verschreibung dieser Malaria-Notfalltabletten wissen?

Einnahme von Medikamenten (Betablocker), Antiepileptika -> Arzt fragen

Antidepressiva

Schwangerschaft, Stillen; Medikamentenunverträglichkeit, Herzrhythmusstörungen, verlängerte QT Zeit

### Fieber

nach Tropenaufenthalt - ALARMSYMPATOM! Gleichtags Arzt aufsuchen für Blutuntersuch

### Malarone® (TAP) ATOVAQUONE + PROGUANIL

für welche Reiseziele: Thailand, Vietnam, Laos, Kambodscha, Philippinen, Malaysia, Indonesien, inklusiv Bali, Iran, Pakistan, Afghanistan, Indien, Sri Lanka, Jemen, Südamerika mit Mefloquinunverträglichkeit

Für Reisende  
Dosierung:  
An 3 Tagen

Kö.Gew.> 40kg: 1x4 Tbl. Malarone täglich  
31-40kg: 1x3 Tbl. Malarone täglich  
21-30kg: 1x2 Tbl. Malarone täglich  
11-20kg: 1x1 Tbl. Malarone täglich  
9-10kg: 1x3 Tbl. Malarone junior tgl.  
5-8kg: 1x2 Tbl. Malarone junior tgl.

### Riamet® (TAL) ARTEMETER + LUMEFANTRIN

für welche Reiseziele: Thailand, Vietnam, Laos, Kambodscha, Philippinen, Malaysia, Indonesien, Iran, Pakistan, Afghanistan, Indien, Sri Lanka, Jemen, Südamerika; gewisse verschiedene Gebiete in Tanzania (Dar es Salaam, Sansibar)

für Reisende  
Dosierung:

mit Lariam / Mefloquinunverträglichkeit  
Erwachsene und Kinder ≥ 35kg  
Körpergewicht oder ab 12 Jahren  
2x 4Tbl pro Tag x 3 Tage (0,8,24,32,48,60h)  
Kinder: 5-15kg: 2x1 Tbl. pro Tag x 3 Tage  
Kinder: 15-25kg: 2x2 Tbl. pro Tag x 3 Tage  
Kinder: 25-35kg: 2x3 Tbl. pro Tag x 3 Tage

### Weitere Informationen

web [www.osir.ch](http://www.osir.ch)  
Telefon 071 288 32 55  
Automatische Impf- und Malariainfo 071 288 50 66  
Hausarzt [www.osir.ch/m\\_inforeisende/hausarzt.php](http://www.osir.ch/m_inforeisende/hausarzt.php)  
OSIR Arzt [www.osir.ch/m\\_osiraerzte/aerzte.php](http://www.osir.ch/m_osiraerzte/aerzte.php)  
Auslandreisen [www.osir.ch/PDF/auslandreisen.pdf](http://www.osir.ch/PDF/auslandreisen.pdf)

### Nivaquine® CHLOROQUIN (TCHLORO)

für welche Reiseziele: Dominikanische Republik, mittel-amerikanische Länder (ausser Mexiko)

Dosierung Erwachsene: 1. Tag: 6 Tabl. Nivaquine (nach dem Essen)  
6 Std. später: 3 Tabletten  
2. + 3. Tag: je 3 Tabletten Nivaquine

Dosierung Kinder: 1. Tag: 10mg/kg Kö-Gew. in einer Dosis  
6 Std. später: 5mg/kg Körpergewicht  
2. + 3. Tag: 5mg/kg Körpergewicht

### Mögliche Medikamentennebenwirkungen

Malarone: Bauchweh, Kopfweh, Uebelkeit, Erbrechen, Durchfall, Husten  
Artemether: Schwindel, Kopfweh, Uebelkeit, Durchfall, Müdigkeit  
Nivaquine: Schwindel, Kopfweh, Uebelkeit, Juckreiz, Ausschlag